



منابع :

داروهای ژنریک ایران ترجمه محمد آبگون

Nursing drug reference ۲۰۱۸

www .wikiped.com

آمیودارون

www.shlenjan.mui .ac.ir

تماس شماره: 03152237326

واحد آموزش به بیمار 2209

کد پمفلت: Sh.L/EP/036/AC

بازنگری بهار 1403



- در صورت بروز هر گونه عدم تعادل و اشکال در راه رفتن حتماً به پزشک خود مراجعه کنید .

- جهت تحمل بهتر عوارض گوارشی ترجیحاً همراه با غذا میل شود . بهتر است دارو در ساعات مشخص و همزمان با غذا (خصوصاً در کودکان) مصرف شود .

- این دارو در زمان شیر دهی منع مصرف دارد.

- جهت کاهش عوارض دارو از عینک آفتابی تیره و کلاه نقاب دار و کرم ضد آفتاب استفاده کنید .

- در طول روز در معرض آفتاب شدید در طولانی مدت قرار نگیرید

نکاتی که زمان مصرف این دارو باید مورد توجه قرار گیرد:

- از پرستار خود بخواهید چگونگی اندازه گیری تعداد نبض را به شما بیاموزد و در صورت داشتن تعداد نبض کمتر از ۶۰ تا در طول ۱ دقیقه به پزشک خود اطلاع دهید .

- ممکن است در اثر مصرف دارو لکه هایی روی پوست یا قرنیه چشم شما به وجود بیاید که ممکن است ۷-۱ ماه طول بکشد . توجه داشته باشید لکه های ایجاد شده روی چشم شما روی قدرت بینایی شما تاثیر منفی ندارد . در صورت درد چشم ، تغییرات بینایی ، حساسیت شدید به نور و خارش و تحریک شدید چشم به پزشک مراجعه کنید .

- به صورت دوره ای طبق نظر پزشک خود برای چک فعالیت کبد ، ریه ها ، تیروئید ، چشم ، اعصاب و دستگاه گوارش خود به پزشک مراجعه کنید .

مشکل در به خواب رفتن ، احساس گر گرفتگی ، تغییر در حس چشایی و بویایی ، افزایش بزاق ، کاهش اشتها عوارض جانبی نادر اما جدی (در صورت بروز این علائم هرچه سریع تر با پزشک مشورت کنید :

- مشکلات کبدی : ادرار تیره همراه با خستگی ، کم اشتهایی ، تهوع ، دل درد و مدفوع رنگ روشن و پوست زرد
- مشکلات ریه : مشکل در تنفس ، تنگی نفس ، سرفه ای که جدید باشد یا بدتر شده باشد .
- مشکلات تیروئید : تغییر وزن بدون تلاش ، اضطراب ، بی قراری ، ورم گردن ، ریزش مو ، افسردگی
- استیون جانسون : پوست قرمز ، متورم ، ایجاد تاول ، پوسته پوسته شدن ، چشم قرمز ، زخم دهانی
- عوارض نادر و جدی : عدم تعادل ، لرزش ، آفتاب سوختگی ، تغییر رنگ پوست (آبی خاکستری) ، احساس بی حسی یا گزگز ، درد چشم

آمیودارون دارویی است که برای جلوگیری و درمان انواع خاصی از بی نظمی های ضربان قلب استفاده می شود .

نحوه جذب و دفع :

اثر آن تقریباً ۲روز تا ۳ هفته پس از اولین مصرف شروع می شود و اثر درمانی ۱ هفته تا ۵ ماه بعد از شروع مصرف حاصل می گردد . بعد از قطع درمان در کودکان تا چند هفته و در بزرگسالان تا چند ماه اثر دارو ادامه دارد . این دارو از طریق گوارش جذب شده و در کبد تجزیه و با مدفوع دفع می شود .

شکلهای قابل دسترس :

این دارو به صورت قرص های ۴۰۰ و ۲۰۰ میلی گرمی و آمپولهای ۱۵۰ میلی گرمی می باشد .

عوارض جانبی :

به ترتیب عوارض شایع تر : بیوست ، حالت تهوع ، احساس افت انرژی و خستگی ، دل درد ، سر درد ،