

آنژیوگرافی

آنژیوگرافی عروق کرونر قلب یکی از دقیق ترین روشهای تشخیصی بیماریهای عروق قلب می باشد که سالانه بیش از یک میلیون بار در جهان انجام می شود . هدف از آنژیوگرافی مشخص کردن تنگی عروق کرونر و شدت گرفتگی آنها می باشد .

آمادگی قبل از انجام آنژیوگرافی :

- ۱- در صورت داشتن سابقه بیماری خاص یا مصرف دارو به پزشکتان اطلاع دهید.
- ۲- روز قبل از انجام آنژیوگرافی جهت آزمایشات تکمیلی و تکمیل پرونده مراجعه نمائید .
- ۳- در صورتی که سابقه بیماریهای انعقادی خونی دارید حتماً پزشک را مطلع سازید .
- ۴- اگر سابقه حساسیت به مواد رنگی (ید) یا ماهی یا توت فرنگی دارید حتماً به پزشکتان اطلاع دهید .
- ۵- دستورات قبل از آنژیوگرافی را به دقت مطالعه کرده و انجام دهید .

انجام آنژیوگرافی

در اغلب موارد لوله باریکی از طریق رگ ران یا رگ دست واقع در قسمت بالای کشاله ران وارد می شود قبل از انجام این عمل محل ورود لوله استریل و بی حس می شود در تمام مدت انجام این عمل شما کاملاً هوشیار هستید . آنژیوگرافی احتیاج به بیهوشی ندارد .

انجام آنژیوگرافی با هیچ گونه ناراحتی یا درد همراه نمی باشد فقط در زمان تزریق ماده رنگی ممکن است احساس گرگرفتگی کنید که معمولاً با انجام سرفه یا نفس عمیق برطرف می شود .

بعد از انجام آنژیوگرافی لوله باریک خارج می شود و سوراخ محل خروج لوله باریک بدون احتیاج به بخیه با اندکی فشار بسته می شود .

به طور معمول مدت زمان انجام آنژیوگرافی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می باشد .

مراقبت های بعد از آنژیوگرافی:

بعد از آنژیوگرافی شما به بخش بستری منتقل می شوید . در زمان ورود به بخش ممکن است کمی احساس گیجی کنید که به دلیل اثر داروی آرامبخش می باشد .


در طی ۷ ساعت بعد از ورود به بخش کاملاً به حالت دراز کشیده روی تخت قرار بگیرید .

در طول مدت بستری محل ورود لوله باریک توسط پرستاران چند بار مورد بازبینی قرار می گیرد و از نظر خونریزی احتمالی بررسی می شود.





آنژیوگرافی



www.shlenjan.mui.ac.ir

تماس شماره: 03152237326

واحد آموزش به بیماران 2209

کد پمفلت: Sh.L/EP/029/AC

بازنگری بهار 1403

- در صورتیکه تصمیم به دوش گرفتن داشتید روی صندلی بنشینید، آب حمام خیلی گرم یا خیلی سرد نباشد زمان دوش ۵ الی ۱۰ دقیقه باشد.

- در صورت بروز خونریزی، تورم، خونمردگی، درد، تب به پزشک اطلاع دهید.

موقع استفاده کنید- در زمان مقرر به پزشک مراجعه کنید.

و محیط های پر استرس پرهیز کنید در- داروهای خود را به

- از هیجانات شدید

صورت داشتن وزن بالا، وزن خود را کاهش دهید.

- حتماً ورزش و پیاده روی را در برنامه زندگی خود بگنجانید

ترک- رژیم غذایی کم نمک و کم چرب را رعایت فرمائید.

- در صورت مصرف دخانیات (سیگار و قلیان) آن را

کنید.

منبع:

- قلب و عروق برونر و سودارت ۲۰۱۰

و جواب آنژیوگرافی را از دفتر بخش- * توجه:

- سی دی

آنژیوگرافی تحویل بگیرید.

۷ تا ۱۰ روز بعد از انجام آنژیوگرافی از فعالیت های

سنگین، بلند کردن اشیاء سنگین، بالا رفتن از پله

رابطه زناشویی خودداری کنید.

- یک روز بعد از انجام آنژیوگرافی پانسمان محل را

بردارید

- در صورتی که محل آنژیوگرافی التهاب، خونریزی یا

تورم داشت، به پزشک مراجعه فرمائید.

- در صورت بروز درد قفسه سینه یا سوزش جناغ هر جا

که هستید دراز بکشید و یک عدد قرص زیر زبانی

استفاده کنید بعد از گذشت ۵ دقیقه در صورت ادامه درد

قرص دوم را استفاده نمائید اگر هنوز درد ادامه داشت

قرص سوم را استفاده کنید اگر درد از بین نرفت به

نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید.