

نکات آموزش به بیمار

- مهمترین نکته آموزشی در کودک مبتلا به اسهال و استفراغ رعایت بهداشت دستها است که باید قبل از دادن غذا به کودک و بعد از آوردن کودک از دستشویی توسط والدین رعایت شود. حتی والدین باید کودک را نیز تشویق به شستن دستها کنند تا از انتقال بیماری جلوگیری شود.



- دفع بهداشتی دیابروها (پوشک) شیرخوار نیز باید از سوی والدین رعایت شود.
- در مرحله حاد بیماری توصیه می شود کودک در بستر استراحت کند.



۳

علائم بیماری

- تب
- ضعف و بی حالی
- اسهال و استفراغ
- بی اشتہابی
- دردهای شکمی

درمان

با توجه به شدت بیماری و نظر پزشک معالج درمان در منزل یا بستری کودک در بیمارستان انجام می شود.

درمان در بیمارستان:

- سرم درمانی
- آنتی بیوتیک درمانی
- انجام انواع آزمایشات تشخیصی

درمان در منزل

- رعایت رژیم غذایی داده شده طبق دستور پزشک معالج. غذا در حجم کم و دفعات بیشتر داده شود.
- مناسب ترین رژیم غذایی شامل شیر مادر برای شیرخوار، سوپ، موز، سیب، مایعات به شرط اینکه شیرین نباشند)
- مصرف داروهای تجویز شده طبق دستور پزشک معالج
- مصرف پودر ORS (طبق دستور پزشک معالج)

۲

گاسترو آنتریت (اسهال و استفراغ)

به التهاب معده و روده گاسترو آنتریت گفته می شود که باعث بروز اسهال و استفراغ می گردد و بخصوص در کودکان بسیار شایع است. این بیماری در شیرخواران بسیار خطرناک است و بایستی از طرف والدین مورد توجه قرار گیرد.

علت بروز بیماری

علت بروز بیماری ممکن است به دلیل ویروس یا میکروب در دستگاه گوارش باشد.

اگر ویروسها علت بروز بیماری باشند به آن گاسترو آنتریت ویروسی می گویند. بیماری معمولاً با تب و استفراغ همراه است و معمولاً طول مدت بیماری کمتر از یک هفته است.

اگر انواع میکروبها باعث بروز بیماری باشد به آن گاسترو آنتریت میکروبی گویند که معمولاً طول مدت بیماری بیشتر است. بیمار از تب و اسهال خونی و دردهای شکمی موقع دفع مدفع شاکی است.



۱



بیمارستان شهادی لجان
استان ایلام

بیمارستان شهادی لجان

و استفراغ (گاسترو آنتریت در کودکان (اسهال)



www.shlenjan.mui.ac.ir
شماره تماس: 03152237326
 واحد آموزش به بیمار 2209

کد پمفت: Sh.L/EP/028/CI

را قبل از مصرف بجوشانید یا از آب های
استاندار پلتمپ شده استفاده نمایید .



از اضافه کردن قند و شکر به مایعات و غذای
کودک جدا خودداری کنید زیرا باعث تشدید
حرکات روده و تشدید دل پیچه و اسهال کودک
می گردد .

علائم هشدار دهنده جهت مراجعه مجدد به پزشک

- دردهای شکمی
- عدم تحمل غذا و بی اشتہایی
- فرو رفتگی چشمها ، گاهش اشک ، خشک شدن مخاط
و دهان
- خواب آلوگی غیر عادی
- ادرار نکردن یا کم شدن ادرار
- استفراغ
- اسهال خونی
- اسهال مکرر بخصوص اگر خیلی آبکی باشد

- ❖ استفراغ منعی برای دادن پودر ORS نیست .
- ❖ توصیه می شود از مصرف کافئین (چای پرنک ، قهوه) نوشابه های گاز دار و غیر گاز دار به علت تحریک حرکات روده اجتناب شود .
- ❖ از مصرف آب میوه های بازاری خودداری شود .
- ❖ از مواد غذایی مثل دوغ ، ماست و میوه هایی مثل موز استفاده شود .
- ❖ در کودکانی که از شیر مادر تغذیه می شوند شیر دهی ادامه باید و کودکانی که از شیر خشک تغذیه می شوند باید شیر خشک با همان غلظت قبلی (یک پیمانه در ۳۰ سی سی آب جوشیده) ادامه باید .
- ❖ توصیه می شود ناحیه اطراف مقعد بعد از هر بار اجابت مراجح با آب گرم شسته و خشک شود .
- ❖ از دادن هر دارویی بدون اطلاع پزشک به کودک اکیدا خودداری نمایید .
- ❖ از مواد غذایی تازه و بهداشتی برای تهیه غذای کودک استفاده نمایید .
- ❖ اسباب بازیهای کودک را قبل از استفاده شسته و ضد عفونی نمایید .
- ❖ دستهای خود را قبل از شیر دادن به کودک یا تهیه غذا برای او بشویید .
- ❖ میوه و سبزیجات را ضد عفونی نمایید .
- ❖ غذای پخته شده را سریعا میل نمایید . هر چه فاصله زمانی بین پخت غذا و مصرف آن کمتر باشد احتمال آلوگی کمتر است .
- ❖ از آب آشامیدنی سالم استفاده نمایید .
- ❖ اگر امکان دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تصفیه شده در محل زندگی شما وجود ندارد یا آب