

- ✓ داروهای ضدانعقادی مانند آسپیرین ، هپارین
- ✓ داروهای حل کننده لخته که باید طی ۳-۶ ساعت اول بروز نشانه‌ها تجویز شوند.
- ✓ مسکن‌ها مانند مورفین
- ✓ بتا بلوکرها

❖ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- ✓ زمانی که درد قفسه صدی علی‌رغم استراحت و درمان با نیتروگلیسرین بیش از ۱۵-۱۰ دقیقه طول بکشد.
- ✓ زمانی که با درد قفسه صدی از خواب بیدار می‌شوید و درد با یک قرص نیتروگلیسرین برطرف نمی‌شود.
- ✓ زمانی که حمله درد قفسه صدی متفاوت با گذشته یا شدیدتر از حد معمول باشد.

- ✓ تاریخچه بیمار شامل توصیف علایم موجود، تاریخچه بیماری قلبی، تاریخچه سلامت خانوادگی بخصوص بیماری قلبی
- ✓ نوار قلب در ۱۰ دقیقه اول شروع درد یا بلافاصله پس از رسیدن بیمار به اورژانس
- ✓ اکوکاردیوگرافی برای ارزیابی عملکرد بطنی
- ✓ آزمایش خون
- ✓ اسکن قلب
- ✓ آنژیوگرافی (عکسبرداری از رگ‌ها با اشعه ایکس به کمک تزریق ماده حاجب درون آن‌ها)

❖ عوارض

- عوارض که ممکن است در بیماری سندرم کرونری حاد برای شما ایجاد شود شامل:
- ✓ ادم حاد ریوی
 - ✓ نارسایی احتقانی قلبی
 - ✓ شوک قلبی
 - ✓ حمله قلبی
 - ✓ بی‌نظمی‌های ضربان قلب و ایست قلبی

❖ درمان

- اهداف درمان جهت درمان بیماری:
- ✓ کاهش آسیب میوکارد یا عضله قلب
 - ✓ برقراری مجدد جریان خون کرونری از طریق تجویز اورژانسی داروهای حل کننده لخته با انجام بالون
 - ✓ کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن و افزایش عرضه اکسیژن از طریق تجویز داروها، اکسیژن و استراحت در بستر.
 - ✓ جراحی پیوند عروق قلب، در زمان‌هایی که سرخرگ‌های قلبی شدیداً مسدود شده‌اند.

❖ دارو

- در افرادی که مبتلا به بیماری سندرم کرونری حاد هستند پزشک از درمان دارویی زیر استفاده می‌نماید:
- ✓ نیترات‌ها (نیتروگلیسرین) جهت گشاد کردن عروق قلب و افزایش عرضه اکسیژن به عضله قلب