



پیارستان شهادی لجان

هیپوتیروئید مادرزادی



www.shlenjan.mui.ac.ir
شماره تماس: 03152237326
واحد آموزش به بیمار 2209

کد پمفت: Sh.L/EP/040/C1

علایم بیماری:

در ابتدای تولد این بیماری هیچ علامتی از خود ندارد و با دیدن نوزاد قابل تشخیص نمی‌باشد. بنابراین علائم بیماری در اغلب موارد دیر ظاهر شده و با افزایش سن شیرخوار علایم بتدریج قابل مشاهده می‌شوند و در واقع هنگامی علائم بیماری را می‌بینیم که آثار سوء خود را به جای گذاشته است. برخی از آنها عبارتند از:

- * زردی طول کشیده
- * یبوست
- * پوست سرد و خشک و رنگ پریده
- * زبان بزرگ و گریه خشن
- * فتق نافی
- * رشد با تأخیر



نوزاد مبتلا به کشم کاری، مادرزادی، تیروئید درمان نشده

۲

هیپوتیروئید مادرزادی چیست؟

این بیماری در اثر کم کاری غده تیروئید در کودکان ایجاد می‌شود. این غده در ناحیه گردن قرار گرفته است و هورمونی (ماده شیمیایی) به نام تیروکسین تولید می‌کند که برای رشد و تکامل تمامی اعضای بدن به ویژه سیستم عصبی ضروری است.

بسیاری از مراحل رشد و نمو مغز در دوران پس از تولد (نوزادی) ادامه دارد از آنجایی که برای بدست آوردن بهره هوشی طبیعی به مقداری کافی از هورمون تیروئید تا ۳ سالگی نیاز است. در کم کاری مادرزادی تیروئید سطح هورمون تیروکسین کمتر از میزان طبیعی است و لذا رشد و نمو طبیعی مغز کودک کافی نمی‌باشد و خسارات جبران ناپذیری خصوصاً به مغز کودک وارد می‌سازد.



نکات آموزشی:

* به دلیل کم و غیر اختصاصی بودن علائم و نشانه های هیپوتیروئیدی نوزادان در اوایل دوران شیرخوارگی و نوزادی، در اغلب موارد تشخیص بیماری با تأخیر صورت می گیرد.

* شناسایی و درمان با تأخیر بیماری با عوارض جبران ناپذیر مغزی بویژه کاهش شدید ضریب هوشی در مبتلایان همراه است.

* در صورت شناسایی و درمان بموضع بیماری، از عوارض بیماری پیشگیری به عمل می آید.

* آزمون های غربالگری در دسترس می باشند و از حساسیت بالایی برخوردار هستند.

* درمان بیماری براحتی امکان پذیر است و نیاز به اقدامات بیمارستانی و پر هزینه ندارد. درمان هیپوتیروئیدی نوزادان در صورتی که بموضع آغاز شود، کاملا موثر است.

* عدم وجود سابقه بیماری کم کاری مادر زادی تیروئید در خانواده، دلیلی برای انجام ندادن غربالگری در نوزاد نیست و نباید هیچ نوزادی را از غربالگری محروم کرد.

درمان :

- بعد از اینکه مشخص شود غده تیروئید نوزاد کم کار است بلافاصله توسط پزشک داروی خوراکی برای وی تجویز می شود و نیاز به بستری در بیمارستان ندارد و تقریباً همه کودکان بیماری که زود هنگام تشخیص داده شده و تحت درمان به موقع و مناسب قرار می گیرند از رشد و نمو و بهره هوشی طبیعی برخوردار خواهند شد.

- به همین جهت برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در مراکز بهداشتی درمانی برای کنترل این بیماری اجرا می گردد.

- مصرف دارو باید طبق دستور پزشک باشد و تمام توصیه های هنگام مصرف قرص رعایت شود.

- توجه داشته باشد که نباید به توصیه اطراحیان مقدار قرص را تغییر داد.

- پس با مصرف به موقع و درست قرص لوتیروكسین می توان علاوه بر جلوگیری از عقب ماندگی ذهنی از کوتاهی قد و عوارض دیگر این بیماری جلوگیری کرد.

تشخیص بیماری :

تشخیص زود هنگام تنها با انجام آزمایش امکان پذیر است. در روزهای ۳ تا ۵ بعد از تولد با (تهیه چند قطره خون از پاشنه پای نوزاد) می توان به احتمال وجود بیماری پی برد.

شناسایی زود هنگام این بیماری و درمان به موقع آن نجات دهنده فرزند شما از عقب ماندگی ذهنی و آسیب جدی مغزی است.

