

مراقبت های پرستاری حین ترجیح

- آموزش استفاده صحیح از داروهای تجویز شده
- آموزش رعایت بهداشت محل عمل و باز و خشک نگهداشتن محل عمل
- مراجعه ده روز بعد از عمل جهت برداشتن بخیه ها
- مراجعه یک ماه بعد برای دریافت جواب پاتولوژی
- استحمام به صورت دوش سرپایی
- رژیم پرپروتئین ، پرووتامین و پرفیبر
- رعایت رژیم دیابتی در بیماران دیابتی
- از خوردن غذاهایی که باعث ایجاد یبوست میشوند پرهیز کنید.
- اجتناب از کارهای سنگین به مدت دو ماہ
- از لباسهای زیر نخی استفاده کنید.
- اجتناب از پوشیدن لباسهای تنگ و پلاستیکی
- از نشستن های طولانی و یا بی حرکتی که باعث ایجاد لخته در پا میشود خودداری کنید.

۳

روش های هیسترکتومی

- واژینال
- ابدولینال یا شکمی:

رحم برداری از راه شکم یک عمل جراحی باز است که به پزشکان اجازه برداشتن کامل دستگاه تناسلی را میدهد.



۴

هیسترکتومی (عمل برداشتن رحم)

به برداشتن رحم به دنبال یک عمل جراحی گویند که ممکن است دیگر اعضای مربوطه مانند تخمدانها، لوله های رحم و دهانه رحم به همراه رحم برداشته شود.

به چه علت هیسترکتومی انجام میشود؟

- درد های مزمن لگنی
- بد خیمی های دستگاه تناسلی
- خونریزی های شدیدی که به درمان دارویی جواب نداده باشد.
- فیبروم های رحم با عارضه
- خونریزی شدید بدنال شلی رحم بعد زایمان یا سزارین
- پارگی های رحم و یا عروق بزرگ رحم
- برای عقیم سازی
- هیسترکتومی به دنبال وارونگی رحم که بیشتر به دنبال کشش زیاد بندناو اتفاق میفتد
- میوم های رحم

.



بیمارستان شهادی لنجان

بنیاد پژوهشی مددکاری انسان ایران

هیستر کتوهی

واحد آموزش به بیمار

منبع : پرستاری بروونر و سودارت

www.shlenjan.mui.ac.ir

تماس شماره: 03152237326

واحد آموزش به بیمار 2209

کد پمفات: Sh.L/EP/011/MC

در صورت مشاهده علائم زیر فوراً به پزشک مراجعه کنید

- تپش قلب شدید
- افت فشار خون
- عدم توانایی دفع گاز و مدفوع
- مشاهده خونریزی از واژن
- مشاهده خون در ادرار
- خروج ترشحات بدبو و غیر طبیعی از واژن یا از محل زخم
- احساس شکم درد شدید
- وجود قرمزی و التهاب در ساق پاها
- وجود درد در قفسه سینه
- تب

- اجتناب از بلند کردن اجسام سنگین
- اجتناب از رانندگی تا دو ماه
- در صورت داشتن درد بعد از عمل از مسکن تجویز شده طبق دستور پزشک استفاده شود.
- انجام تنفس عمیق در طی روز
- حرکت دادن پاها و تغییر پوزیشن هنگام استراحت در تخت
- هنگام عطسه و سرفه در روزهای اول، با یک بالش از ناحیه جراحی حمایت کنید.
- مصرف مایعات را افزایش دهید.
- به صورت منظم پیاده روی داشته باشید تا دچار بیوست نشوید
- از مصرف غذاهای نفاخ تا برداشتن بخیه ها خودداری کنید.