

- ✓ مشکلات تغذیه ای و عدم مصرف اگر غذاهای حاوی کلسیم و ویتامین D در دوران جوانی
- ✓ عدم فعالیت بدنی
- ✓ استفاده از تباکو و مشروبات الکلی

❖ علائم شکستگی لگن

- ✓ عدم تحمل سنگینی وزن بروی طرف آسیب دیده
- ✓ سفتی، کبودی و ورم در اطراف منطقه شکستگی
- ✓ عدم حرکت بلا فاصله بعد از زمین خوردن
- ✓ درد شدید در قسمت جلوی ران و یا در کشاله ران
- ✓ کوتاه شدن پای آسیب دیده
- ✓ تمایل پای آسیب دیده، به خارج از بدن

❖ تشخیص شکستگی لگن

- ✓ پزشک با دیدن علائم و مشاهده قرار گرفتن غیرطبیعی مفصل ران و پایی تواند شکستگی لگن را تشخیص دهد.
- ✓ تصویربرداری با اشعه ایکس
- ✓ سی تی اسکن و ام آر آی

❖ درمان شکستگی لگن


- نوع جراحی بستگی به محل شکستگی استخوان، شدت شکستگی و سن فرد دارد. روش های مختلف جراحی عبارتند از:
 - ✓ جراح پیچ فلزی را وارد استخوان می کند تا استخوان های شکسته را به هم پیچ دهد و تا وقتی استخوان جوش نخوردد است، آن پیچ درون بدن باقی می ماند.
 - ✓ جایگزینی جزئی مفصل ران: اگر انتهای استخوان شکسته به درستی قرار نگیرد و تخریب شده باشد، پزشک ممکن است سر و گردن استخوان ران را بردارد و به جای آنها، پروتز فلزی قرار دهد.
 - ✓ جایگزینی کلی مفصل ران: این مفصل خارج شده و مفصل مصنوعی بجای آن کار گذاشته می شود.

❖ عوارض

- اگر شکستگی لگن باعث شود فرد برای مدت زمان طولانی، بی حرکت بماند، ممکن است یک و یا چند مشکل زیر را پیدا کند:
 - ✓ لخته خونی در پاهای و یا در ریه ها
 - ✓ زخم بستر

❖ شرح

لگن پایین ترین قسمت تن است و در جایی قرار دارد که تن به اندام پایینی مانند پاهای متصل می شود. استخوان لگن یک ساختمان حلقوی است که در بالا به ستون فقرات متصل شده و در پایین به استخوان های ران مفصل می شود. وظیفه لگن در واقع انتقال نیروی وزن از تن به هر دو پا است. همچنین در موقع نشستن، نیروی وزن تن مستقیماً از طریق لگن به زمین وارد می شود. لگن همچنین حاوی ارگان های گوارشی و تولید مثل بوده و عروق و اعصاب مهمی از آن عبور کرده و از تن به اندام تحتانی یا پایینی می روند.



❖ علل شکستگی لگن

- ✓ تصادفات رانندگی
- ✓ افتادن از بلندی
- ✓ در افراد دارای استخوان های ضعیف، شکستگی لگن در اثر ایستادن بر روی یک پا و یا چرخیدن پا رخ می دهد.

❖ عوامل خطر

- ✓ بالا رفتن سن
- ✓ استخوان ها در زنان نسبت به مردان، زودتر پوک می شوند.
- ✓ بیماری پوکی استخوان یکی از مهم ترین عوامل خطر شکستگی لگن می باشد، سایر بیماری هایی که ممکن است باعث شکنندگی استخوان گردند عبارتند از: اختلالات غدد درون ریز مثل پرکاری تیروئید و اختلالات روده ای که باعث کاهش جذب ویتامین D و کلسیم می شود.
- ✓ مصرف داروهای کورتونی به مدت طولانی

- ✓ از ریش تراش برقی، مسواک نرم استفاده کنید و در صورت نیاز به تزریقات محل آن را به مدت ده دقیقه فشار دهید
- ✓ کارت هویت پزشکی مبنی بر مصرف داروی ضد انعقاد را همیشه همراه داشته باشید.

❖ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- ✓ در صورت وجود هر گونه قرمزی، تورم، حساسیت و یا ترشح چرکی از محل زخم و یا بروز تب، سریعاً به پزشک معالج مراجعه کنید. در شکستگی اطراف مفصل ران در صورت مشاهده کوتاهی اندام، چرخش داخلی یا خارجی، درد شدید لگن و عدم توانایی حرکت در اندام که ممکن است دال بر در رفتگی پروتز باشد به پزشک معالج خود مراجعه کند.
- ✓ در صورت وجود هر گونه قرمزی، تورم، حساسیت و یا ترشح چرکی از محل زخم و یا بروز تب، سریعاً به پزشک معالج و مراکز درمانی مراجعه کنید.
- ✓ خونریزی از بینی و لثه و خلط خونی، وجود خون در ادرار، مدفوع قرمز یا قیری رنگ، خونریزی طولانی از محل های بریدگی، خونریزی قاعده ای زیاد ، کبودی روی پوست ، تب و لرز ، خستگی ، زخم گلو، تهوع و استفراغ و... را به پزشک اطلاع دهید.

- ✓ عفونت دستگاه ادراری
- ✓ ذات الريه يا عفونت ريه

❖ رژیم غذایی

- ✓ جهت ترمیم سریعتر محل زخم و استخوان، از رژیم غذایی پرپروتئین، پر کالری و سرشار از ویتامین استفاده کنید مصرف سبزیجات و مرکبات و آب میوه های تازه حاوی ویتامین C ، می تواند به بهبود سریعتر زخم، رفع یبوست و بهبود اشتها کمک کند.
- ✓ از مواد غذایی حاوی ویتامین های ای E ، ب6 K، D، B6 کا، دی و C سی استفاده کنید زیرا در تشکیل جوشگاه شکستگی و در سرعت جوش خوردن شکستگی نقش مهمی دارند.
- ✓ از مصرف مواد غذایی کافین دار (قهوه، نوشابه و ...) اجتناب کنید زیرا باعث افزایش دفع کلسیم از ادرار می شوند و جوش خوردن را به تاخیر می اندازند.
- ✓ مصرف شیر و لبنیات را (در بیمارانی که مدت زیادی در بستر باقی می مانند) به علت احتمال ایجاد سنگ های ادراری محدود کنید.
- ✓ مصرف رژیم غذایی با فیبر زیاد و مایعات می تواند سیستم گوارشی را تحریک و از ایجاد یبوست و نفخ جلوگیری کرده و بهبود اشتها کمک کند.
- ✓ مایعات کافی مصرف کنید و از عفونت ادراری جلوگیری نمایید.

❖ دارو

- ✓ در صورت استراحت در بستر، داروهای ضدانعقادی برای جلوگیری از لخته شدن خون در ورید های اندام های تحتانی داده می شود .
- داروهای تجویز شده از طرف پزشک معالج (آنتی بیوتیک ها، ضدانعقادها ، ضد دردها، ضد التهاب و...) باید در فاصله زمانی معین مصرف گردد. بدون دستور پزشک داروی خود را قطع نکنید و از مصرف خودسرانه دارو خودداری کنید.
- ✓ بدلیل مصرف داروهای ضدانعقادی، آزمایشات خون شامل پی تی PTT ، پی تی CBC طبق دستور پزشک بطور منظم انجام دهید.