



بیمارستان شهری لنجان

موضوع: شکستگی لگن

www.shlenjan.mui.ac.ir
تماس شماره: 03152237326
واحد آموزش به بیمار 2209

کد پمفت: Sh.L/EP/031/OR
بهار 1403

- ✓ از رژیم غذایی حاوی لبزیات، گوشت، سبزیجات تازه و میوه‌ها استفاده نماید.
- ✓ مصرف نوشابه گازدار به دلیل کربنات و فسفر موجب برداشتن کلاسیم ازا استخوان می‌شود و تأثیر در پوکی استخوان دارد از مصرف آن خودداری نمایید.
- ✓ استفاده از دخانیات (مثل سیگار- قلیان) قطع شود. چون باعث می‌شود استخوان دیرتر جوش بخورد.
- ✓ جهت جلوگیری از خشم بسترن نقاط فشاری را کنترل کنید و تغییر پوزیشن هر دو ساعت داده شده و از ساییدگی پوست جلوگیری شود.
- ✓ باید ملافه بیمار صاف و خشک باشد در صورت مرطوب بودن تعویض شود.
- ✓ از توالت فرنگی و تختخواب در منزل استفاده نماید.
- ✓ اگر نشانه‌های عفونت (درد، تورم، ترشحات چركی و تب) دیده شود سریعاً به مطب مراجعه نمایید.

- ✓ تمرينات حرکتی که توسط پزشك داده می‌شود باید به طور مرتب در منزل ادامه یابد تا دچار خستگی مفاصل نشويد.
- ✓ به علت استراحت در بستر احتمال بروز مشکلات ناشی از بی‌حرکتی نظیر بیوست و کندی جریان عروق و مشکلات ریوی وجود دارد. دریافت مایعات و رژیم غذایی مناسب و ورزش‌های توصیه شده و انجام سرفه مؤثر این مشکلات را کاهش می‌دهد.
- ✓ برای پیشگیری از مشکلات ریوی جهت جلوگیری از توقف جریان خون جوراب ضد واریس طبق دستور پزشك استفاده نماید و روزی دوبار جوراب‌ها را به مدت بیست دقیقه درآورید و مراقبت‌های لازم را انجام دهید.
- ✓ با قرار دادن یک بالش در بین پاهای خود اندام‌ها را در وضعیت دور از هم و امتداد هم قرار دهید.

توصیه‌ها:

- ✓ پا زسمنی که روی زخم گذاشته شده است باید توسط یک فرد ماهر روزانه تعویض شود.
- ✓ معمولاً در هر روزی که پاسمن تعویض می‌شود لکه‌هایی در روی پازسمن مشاهده می‌شود که بر اثر ترشحات طبیعی زخم است این ترشحات ممکن است تا یکی دو هفته ادامه یابد و بعد از آن ترشح زخم قطع شده و خشک شود. در این زمان دیگر نیاز به تعویض پازسمن نیست. اگر ترشح زخم بعد از این مدت نیز همچنان ادامه یابد و علائم عفو نت از جمله: تب و لرز قرمزی و خروج ترشح چرکی از ناحیه عمل دیده شد به پزشک مراجعه کنید.
- ✓ بخیه‌ها معمولاً بعداز دو تا سه هفته پس از جراحی برداشته می‌شوند.
- ✓ با عصای زیر بغل می‌توانید راه بروید ولی پای عمل شده نباید زمین گذاشته شود.

مراقبت‌های قبل از عمل:

- ✓ استفاده از کیسه یخ جلوگیری از درد و تورم
- ✓ ناشتا بودن حداقل ۸ ساعت قبل از عمل
- ✓ قطع داروهای ضد انعقاد مثل آسپرین قبل از عمل
- ✓ در آوردن وسایل و زیور آلات قبل از عمل

مراقبت‌های بعد از عمل:

- ✓ انجام تنفس عمیق و سرفه موثر در صورت داشتن درد یا مشکل به پرستار خود اطلاع دهید.
- ✓ پس از شروع رژیم غذایی طبق دستور پزشک از مایعات فراوان استفاده نمایید.
- ✓ بعداز جراحی طبق دستور پزشک کنار تخت یا روی مبل بنشینید.

علت شکستگی لگن:

- ✓ سقوط از ارتفاع
- ✓ تصادفات
- ✓ حوادث ورزشی
- ✓ حین کار
- ✓ زمین خوردن

علائم و نشانه‌ها:

- ✓ کبود شدن پوست
- ✓ حساسیت و درد در محل کمربند لگنی
- ✓ تورم موضعی
- ✓ احساس سوزش و کوفتگی

عوارض:

- ✓ عفونت
- ✓ زخم بستر
- ✓ لخته شدن خون در پاهای
- ✓ اختلال در راه رفتن
- ✓ بد جوش خوردن یا جوش نخوردن