



اقدامات لازم در هنگام مواجهه با فرد مسموم شده با متادون و مواد مخدر

- (۱) سریعاً باید با اورژانس تماس گرفته شود.
- (۲) بهتر است بیمار به سمت پهلو خوابانده شود تا از ورود ترشحات دهانی و معده ای به مجاری تنفسی جلو گیری شود.
- (۳) مهمترین اقدام زمانیکه فرد دچار تنفس مصنوعی شده است دادن تنفس مصنوعی میباشد در صورتیکه تنفس مصنوعی را بلد نیستید بهتر است با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیریدتا شما را راهنمایی کند، در صورتیکه بیمار قادر نبض بود باید ماساژ قلبی را شروع کنید.
- (۴) پادزهر مسمومیت با متادون و مواد مخدر دارویی بنام نالوکسان میباشد که تزریق آن در بیمارستان و توسط پرسنل درمانی صورت میگیرد.



هشدارها و نکات مهم:

- از اقدام خودسرانه جهت افزودن میزان مصرف متادون خودداری کنید.
- به دلیل خواب آسودگی از انجام فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری بالایی دارند، مثل رانندگی و کار با وسایل برش و صنعتی خودداری شود.
- از مصرف همزمان متادون و مخدراها با داروهای خواب آور خودداری شود.

منبع: راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها
— دکتر مژگان مشایخی

متادون چیست؟

متادون در دسته ای از داروها قرار دارد که به عنوان اپیوئیدها و یک داروی ترک اعتیاد شناخته می شوند. این دارو در جنگ جهانی دوم توسط آلمان تولید شد و در آمریکا در ابتدا به عنوان ضد درد قوی برای دردهای بسیار شدید به کار برده شد. این دارو امروزه علاوه بر تسکین درد اغلب به عنوان بخشی از درمان واستگی به مصرف هروئین یا نارکوتیکها استفاده میشود. متادون به فرم های دارویی قرص خوارکی، فرآورده تزریقی، پودر و محلول خوارکی در بازار دارویی ایران عرضه می شود.

علایم مصرف بیش از اندازه متادون چیست؟

تغییر دوز دارو به صورت خودسرانه یا مصرف غیر قانونی متادون و مواد مخدر ممکن است موجب مسمومیت با دارو شود. علایم مصرف بیش از حد متادون به شرح زیر است. در صورت مشاهده این علائم به سرعت به مراکز درمان مسمومیت مراجعه نمایید:

- تنفس آهسته
- ضربان قلب کند
- خواب آسودگی شدید
- ضعف عضلانی
- پوست سرد و مرطوب
- کوچک شدن مردمک ها
- بیهوشی و کما

مسومیت با متادون

و مواد مخدر


(ویژه آموزش به بیمار)

www.shlenjan.mui.ac.ir
شماره تماس: ۰۳۱۵۲۲۳۷۳۲۶
واحد آموزش به بیمار: ۲۲۰۹

کد پمفت Sh.L/EP/004/ER



- ✓ به کودکانی که متوجه می شوند، خطرات مصرف آن را بگویید.
- ✓ به کودک خود مایعات فراوان بدھید تا دارو هرچه سریع تر دفع شود.
- ✓ ممکن است بیوست ایجاد شود با مصرف مواد غذایی پرفیبر مانند سبزیجات و میوه می توان از بیوست جلوگیری کرد.
- ✓ ممکن است تا مدتی کودک بی حال و دچار سرگیجه باشد در این زمان مراقب باشید تا سقوط نکند و زمین نخورد.
- ✓ در زمان مشخص شده توسط پزشک جهت پی گیری درمان به بیمارستان مراجعه کنید.
- ✓ در شروع درمان و نیز در تمام طول دوره مصرف دارو علایم مسمومیت با متادون را سوال کنید.



عارض مسمومیت

به دنبال مسمومیت عارض زیر ممکن است بروز نماید:

- ✓ ادم ریه یا وجود آب در ریه
- ✓ نارسائی کلیوی
- ✓ شوک
- ✓ آسیب مغزی
- ✓ اگر تنفس خیلی کند شود منجر به مرگ میشود.

آموزش به بیمار

- ✓ از نگهداری شربت متادون، حتی در دوزهای بسیار پایین، درشیشه های غیر دارویی (نظیر بطری نوشابه و ...) و شیشه های بدون برچسب حاوی نام دارو اکیدا خودداری کنید.
- ✓ در صورت امکان، تحويل دوز مورد نیاز به صورت روزانه در مراکز ترک اعتیاد انجام پذیرد.
- ✓ شیشه های حاوی متادون میباشد دارای برچسب مخصوص هشدار دهنده حاوی نام فرآورده و توضیحات لازم مربوط به نحوه مصرف دارو باشند.
- ✓ از آنجایی که طعم شربت متادون شیرین است و مصرف کنندگان دارو در برخی موارد آنرا به همراه چای یا نوشابه مصرف می نمایند از نگهداری دارو در یخچال یا کنار سایر نوشیدنی ها خودداری کنید.
- ✓ دارو را دور از دسترس اطفال و در قفسه های قفل دار نگهداری کنید.
- ✓ از مصرف دارو در زمان حضور کودک خودداری کنید.
- ✓ دارو را در ظرف هایی با درب مقاوم که کودک قادر به باز کردن آن نباشد نگهداری کنید.



مسومومیت با متادون و مواد مخدردر

اطفال

مسومومیت کودکان در ۰۸ درصد موارد در سنین بین ۱ تا ۴ سال ایجاد میشود. خوردن حتی یک قاشق از این شربت و یا تعداد اندکی قرص متادون در کودکان منجر به خواب آلودگی، بیهوشی و مرگ ناشی از توقف تنفس خواهد شد.



علائم مسمومیت

نشانه های مسمومیت ناشی از مصرف خودسرانه دارو و مواد مخدر بر حسب نوع دارو و مقدار مصرف فرق میکند. علائم متداول مسمومیت با مواد مخدر در کودکان عبارتند از:

- ✓ خواب آلودگی
- ✓ بی حالی و شل شدن عضلات
- ✓ گشاد یا تنگ شدن مردمک چشمها به صورت غیرعادی
- ✓ سطحی و کندشدن تنفس
- ✓ تهوع و استفراغ ولی همیشه استفراغ بلا فاصله پس از مصرف ایجاد نمی شود.
- ✓ درد قفسه سینه و دیگر علایم مسمومیت بعد از مدت کوتاهی ظاهر شده و پس از گذشت چند ساعت با پیشرفت علائم، کودک جان خود را از دست میدهد.