



بیمارستان شهادی لنجان

موضوع: پانکراتیت

www.shlenjan.mui.ac.ir
تماس شماره: 03152237326
واحد آموزش به بیمار 2209

کد پمپلت: Sh.L/EP/004/OR
بازنگری: بهار 1403

داروها را طبق نظر پزشک و در فواصل منظم
صرف کنید و از قطع دارو بدون اجازه پزشک
خودداری کنید.
از مصرف غذاهای سنگین و پر حجم خصوصاً در
زمان شب خودداری کنید.

اگر دارای عالیم پانکراتیت حاد باشد در صورت
بروز عالیم زیر هر چه سریع تر به نزدیکترین
مرکز درمانی مراجعه کنید:

- ✓ یرقان یا زردی پوست و چشمها
- ✓ تب بالای ۳۸ درجه سانتیگراد
- ✓ کاهش وزن مداوم
- ✓ عالیم کمبود کلسیم نظیر انقباضات
عضلانی یا تشنج
- ✓ درد شدید شکمی طول کشیده
- ✓ درد همراه با تهوع شدید یا استفراغ

آموزش مراقبت در منزل:

از غذاهای زود هضم و کم چرب استفاده شود.
غذاهای دیر هضم شامل (سوسیس، کالباس و
عذابهای فرآوری شده) میباشد
از وعده های غذایی کم حجم در دفعات بیشتر استفاده
شود
صرف الکل و سیگار قطع شود.

از مصرف مواد محرک کافئین دار مانند چای و قهوه
خودداری کنید.

جهت جلوگیری از یبوست از مواد غذایی پرفیبر مانند
سبزی، میوه و مایعات فراوان استفاده کنید.
مواد و ترکیبات موجود در روغن زیتون تازه و ماهی به
بهبود عالیم پانکراتیت یا التهاب لوزالمعده کمک
میکند

با برطرف شدن عالیم بیماری می توانید با نظر
پزشک معالج فعالیت طبیعی خود را به تدریج از سر
بگیرید. در پانکراتیت مزمن محدودیتی از نظر فعالیت
در زمان ابتلا به این بیماری وجود ندارد.
و ضعیت نشسته در حالی که تنفس خم شده یا و ضعیت
خوابیده به پهلو در حالی که زانوها به سمت شکم شده
اند، جهت کاهش درد مناسب است.



. وقتی عالیم حاد فروکش کرد. ۳-۶ روز بعد مایعات و غذا از راه دهان دوباره شروع می شود. تغذیه بیمار با مایعات اندک شروع میشود و سپس با رژیم کم چرب ادامه می یابد. وقتی تغذیه دوباره شروع شد در صورت وجود درد، تهوع و استفراغ که تمامی آنها دلالت به تداوم التهاب دادند حتماً به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید پس از ترجیح از بیمارستان از مصرف الکل و سایر محركهای معده نظیر کافئین اجتناب کرده و رژیم کم چرب و نرم با دفعات متعدد و حجم کم مصرف نمایید.

عواض: فردی که به پانکراتیت مبتلا میشود به دنبال آن ممکن است عواض زیر در فرد بروز نماید :

دیابت شیرین

کمبود مزمن کلسیم

عفونت ثانویه باکتریایی لوزالمعده


خونریزی شدید و تخریب لوزالمعده

تشکیل کیست یا آبسه در لوزالمعده



درمان :

بررسی های تشخیصی ممکن است شامل آزمایش های خون و ادرار، رادیوگرافی شکم، سی تی اسکن یا سونوگرافی لوزالمعده و آندوسکوپی باشد. در پانکراتیت حاد معمولاً بستری کردن بیمار برای تجویز مایعات وریدی، کنترل درد و استفراغ و اصلاح اختلالات متابولیسمی (جران کمبود کلسیم و منیزیم) لازم است. جراحی ممکن است در موارد وجود سنگ های صفراءوی، زخم معده سوارخ شده یا تخلیه منبع عفونت لازم باشد.



پانکراس یا لوزالمعده در قسمت بالایی شکم پشت معده قرار دارد که هورمون ها و آنزیم های گوارشی تولید می کند و باعث هضم غذا می شود. در پانکراتیت حاد آنزیم هایی که توسط لوزالمعده تولید میشود شروع به تخریب خود لوزالمعده میکند. پانکراتیت مزمن معمولاً در پی حملات مکرر پانکراتیت حاد رخ میدهد.

علل پانکراتیت حاد : مصرف الکل، ضربه به شکم یا جراحی، عفونتهای ویروسی، م شکلات متابولیک مانند افزایش کار غده پاراتیروئید، در بیماران بعد از پیوند کلیه، افزایش دمای بدن، افزایش قند خون و چربی خون، داروها، بیماریهای کیسه صفراء، سنگ های مجاري صفراءوی

عالیم شایع :

پانکراتیت حاد شدید: درد شکمی شدید، استفراغ، تورم و نفخ شکم، تب، درد عضلانی، افت فشار خون

پانکراتیت مزمن: درد پایدار خفیف تا شدید اغلب پس از غذا در قسمت فوقانی شکم که گاهی به پشت یا سرا سر شکم انتشار دارد. این درد ممکن است حالت مبههم، سوزشی، مالشی یا خنجری داشته باشد. دوره های درد ممکن است روزها یا هفته ها به طول بینجامد ولی به ندرت کمتر از یک روز ادامه دارد.