

لیست بیماران پر خطر

منظور از بیماران و مراجعین پرخطر در این استاندارد افرادی هستند که بدلیل شرایط موقت یا دائمی نیاز به دریافت خدمات تشخیصی درمانی یا تمهیدات پیشگیرانه ویژه در اولین فرصت را دارند و باید تحت نظر مستمر و منظم با اولویت ویژه قرارگیرند.

مراجعین و بیماران پرخطر غالباً شامل موارد ذیل هستند :

۱. بیماران در معرض سقوط (معیار مورس).


۲. زخم فشاری (معیار برادن).


۳. خودکشی.


۴. سوء تغذیه.

۵. پلی فارمسی.

۶. ترومبوز وریدهای عمقی (معیار ولز).

 با عنایت به اثربخش بودن اقدامات پیشگیرانه در گروه گروه‌های پرخطر در معرض سقوط، زخم فشاری، خودکشی و ترومبوز وریدهای عمقی حتماً از دست‌بند **زرد رنگ** استفاده شود.

 در خصوص خطر **سقوط در کودکان، نوزادان و پلی فارمسی** شناسایی بیماران و در مراحل ارزیابی و سیر مراقبت بایستی مدیریت ایمنی بیمار رعایت شود، اما استفاده از دست‌بند زرد برای این دسته از بیماران الزامی نیست.

 در خصوص **سوء تغذیه** باتوجه به ارزیابی‌های تخصصی تغذیه ایمنی بیمار مدیریت می‌شود و نیازی به استفاده از دست‌بند نیست.