



بیمارستان شهدا لنجان

تیروئیدکتومی

کد: GCC-PA-047/05



www.shlenjan.mui.ac.ir
تماس شماره: 03152237326
واحد آموزش به بیمار 2209

کد پمفت: Sh.L/EP/020/OR
بازنگری: بهار 1403

مراقبت در منزل

⇒ جهت کاهش تورم طنابهای صوتی آرام تر صحبت کرده و از داد زدن خودداری کنید.

⇒ سعی کنید از غذاهای پر کالری استفاده کنید.
⇒ از برداشتن اجسام سنگین اجتناب کنید.

⇒ هنگام خواب سه عدد بالش زیر سر خود بگذارید تا سر شما بالاتر از سطح قلب باشد.

⇒ در دو هفته اول بعد از عمل، هیچ ورزشی انجام ندهید. در دو هفته دوم، فقط مجاز به انجام ورزش‌های سبک هستید.

⇒ توجه داشته باشید تورم ناحیه گلو و صدمه به اعصاب حنجره عوارضی هستند که ممکنست پس از عمل یه وجود آید.

⇒ جهت کنترل دقیق وضعیت تیروئید، حتماً به مطب پزشک یا درمانگاه مراجعه کنید.

⇒ پس از گرفتن جواب پاتولوژی حتماً درمورد ادامه درمان داروئی با پزشک خود مشورت نمایید.

منابع:


برونر.سودارت. پرستاری داخلی- جراحی غدد

لاکمن، پرستاری داخلی- جراحی غدد

⇒ معمولاً پس از عمل جراحی در ناحیه عمل یک یا دو لوله جهت تخلیه ترشحات از محل عمل گذاشته خواهد شد که معمولاً در دومین روز بعد از عمل و قبل از ترخیص برداشته خواهد شد.

⇒ طبق دستوریزشک تازمان برطرف شدن تهوع ممنوعیت دریافت مواد خوراکی خواهید داشت.

⇒ در صورت اشکال در بلع از نوشیدنی های خنک استفاده شود و پس از آن رژیم غذائی نرم مناسب تراست.



بعد از ترخیص از بخش، توصیه های پزشکی را دقیقاً اجرا کرده و پیگیری جواب نمونه برداری انجام شود.

پس از ترخیص از بیمارستان، شما باید یک هفته در منزل استراحت نمایید.

- قبل از عمل لازم است استحمام کنید و در آقایان ناحیه جراحی با ریش تراش کوتاه تراشیده شود، این کار باعث کاهش احتمال عفونت میگردد.



آموزشای بعداز عمل جراحی

بعد از عمل جراحی، با قراردادن دست ها در پشت گردن به هنگام گرداندن سر، از واردکردن فشار بر ناحیه برش جراحی جلوگیری شود.

بهترین و راحت ترین وضعیت به صورت نیمه نشسته به همراه بالا نگهداشتن سر و حمایت از آن با گذاشتن چند بالش می باشد.

در صورت احساس سنگینی و فشار در ناحیه برش جراحی یا اشکال در بقعه، بلافاصله به پرستار مربوطه گزارش دهید.

۳

آموزشای قبل از عمل:

- مصرف رزیم سرشار از کربوهیدرات و پروتئین قبل از عمل جراحی اهمیت زیادی دارد.
- از مصرف چای، قهوه، کولا و سایر محرک ها اجتناب نمود (به منظور کاهش اسهال)
- شما معمولاً در صبح روز جراحی در بیمارستان پذیرش شده و دو تا سه روز بستری میشوید.
- آزمایشهاي قبلی و عکسهاي موجود را بیاورید.
- اگر شما مبتلا به بیماری خاصی هستید یا دارو مصرف میکنید حتماً، به پزشک معالج و بیهوشی اطلاع دهید زیرا ممکن است قبل از عمل به دارو یا مراقبت خاصی نیاز باشد.
- شب قبل از عمل سوب میل کنید و از ۱۲ شب به بعد ناشتا بمانید.
- قبل از عمل طلا و جواهرات، اجسام فلزی، گیره سر، لنز و دندان مصنوعی خود را خارج کرده و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید.

۴

مقدمه:

تیروئید یک غده‌ی درون ریز است که در جلوی گردن و در پایین حنجره قرار گرفته و شبیه به یک پرواز میباشد. این غده یکی از اعضاء مهمی است که سوخت و ساز بدن (متابولیسم) را کنترل می‌کند.

تیروئیدکتومی چیست؟

برداشتن بخشی (۷۰-۸۰ درصد) یا همه غده تیروئید را به روی جراحی تیروئیدکتومی گویند.

در چه مواردی تیروئیدکتومی انجام میشود؟

در درمان پرکاری غده‌ی تیروئید که به درمان دارو جواب نمیدهد.

انسداد راه هوایی در اثر بزرگ شدن غده‌ی تیروئید

سرطان تیروئید

شرایط خاص دیگر

۱